



GUÍA DE APLICACIÓN  
FRAMBUESA


BROTACIÓN	PREFLORACIÓN	CUAJA DE FRUTO	CRECIMIENTO FRUTA	COSECHA POST COSECHA	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
FERTUM® Root 1 L en 100 L de agua					En plantas de vivero y recién trasplantadas. Otorga más vigor a las plántulas y promueve el enraizamiento.
FERTUM® Foliar 5 L/ha.		FERTUM® Foliar 8 L/ha.		FERTUM® Foliar 5 L/ha.	Estimula el desarrollo. Aplicar en inicio de brotación; cuaja de frutos y reservas próxima temporada.
			FERTUM® Silicium PK 6 L/ha.		En cambio de color del fruto.

**OTROS PRODUCTOS FERTUM® RECOMENDADOS:**

Usar solo de ser necesario y bajo la supervisión de un profesional agrónomo.

BROTACIÓN	PREFLORACIÓN	CUAJA	PINTA	COSECHA POST COSECHA	OBJETIVOS Y RECOMENDACIONES
MAGNESIO 1 L/ha					Activa el crecimiento inicial.
		CALCIBORO 2 L/ha			Aplicar 10 días después de la cuaja y repetir a los 14 días. Mejora la fotosíntesis y consistencia del fruto.
			POTASIO 2 L/ha		Aplicar 20 % pinta. Ayuda a la maduración, calibre y color de frutos.

**AUMENTO DE RENDIMIENTO PREVISTO \***



Los resultados pueden variar dependiendo del clima y suelo de cada región.



**ADVERTENCIA:** Este documento no contiene toda la información necesaria para usar el producto. Lea bien las instrucciones de la etiqueta, antes de aplicarlo.

\* Los rendimientos previstos se basan en respetar las dosis recomendadas de FERTUM® Foliar. Los máximos rendimientos exhibidos se pueden dar en circunstancias óptimas.

**NOTA:** FERTUM® Root se vende en Chile como FARTUM® Germinal. FARTUM® es marca comercial en Chile y FERTUM® es marca comercial en los otros países.

[contacto@fartum.cl](mailto:contacto@fartum.cl)

[www.fartum.cl](http://www.fartum.cl)

[info@fertum.cl](mailto:info@fertum.cl)

[www.fertum.cl](http://www.fertum.cl)